

Full Boro

Fertilizante Foliar



Nombre Comercial
Full Boro
Nombre Químico
Boro complejo
Grado
Agrícola

ANÁLISIS QUÍMICO

Boro (B)
15% B p/v
complejado con ácidos carboxílicos

ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Líquido Café
Densidad (20°C) g/L
1300 - 1400
pH directo
7,0 a 8,0
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso

DESCRIPCIÓN

Full Boro está diseñado para prevenir y corregir deficiencias transitorias, disminuyendo desordenes asociados a deficiencia de Boro favoreciendo procesos fisiológicos en los que participa; cuajado de frutos, germinación del polen, desarrollo del tubo polínico, formación de pared celular junto al Calcio y transporte de Potasio, azúcares y reguladores de crecimiento, entre otros. Favorece la formación de cofactores enzimáticos y contribuye a la calidad de la fruta.

Full Boro es un fertilizante foliar complejo con azúcares alcohol lo que permite una alta absorción y translocación del nutriente al interior de la planta. Contiene surfactantes que mejoran la compatibilidad con fitosanitarios y permiten un mejor mojado de las superficies asperjadas.

RECOMENDACIONES DE USO FULL BORO

Cultivo	Dosis l/há	Dosis cc/hl	Época de aplicación
Vid de mesa y Vinífera, Kiwi	1 - 2	100 - 300	Desde brotación a inicio de flor. Inicio de pinta y precosecha.
Cerezo, Nectarino y Ciruelo	1 - 2	100 - 300	Desde botón floral, fruto cuajado y poscosecha.
Pomáceas	1 - 2	100 - 300	Desde botón floral, fruto cuajado y poscosecha.
Nogal, Almendro y Avellano	1 - 2	100 - 300	Desde floración en adelante.
Frutilla, Frambueso, Arándano, Mora	1 - 2	100 - 300	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde inicio de flor cada 7 a 10 días.
Palto y Cítricos	1 - 2	100 - 300	Aplicar desde floración en adelante. 2 aplicaciones.
Coliflor, Brócoli, Repollo.	1 - 2	100 - 300	Aplicar en estado de roseta y a inicios de formación del pan.
Tomate, Pimentón, Melón, Sandía, Zapallo	1 - 2	100 - 300	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde inicio de floración.
Papa	1 - 2	100 - 300	Desde crecimiento vegetativo e inicio tuberización.
Maíz	1 - 2	100 - 300	Aplicar en aparición de la panoja.
Trigo, Avena y otros cereales.	1 - 2	100 - 300	Aplica en hoja de bandera. 2 aplicaciones.